330646 330646

Laxamín
Bisacodilo

comprimidos recubiertos

INDUSTRIA ARGENTINA VENTA LIBRE

FÓRMULA
Cada comprimido recubierto contiene:
Bisacodilo ..... 5,00 mg
Excipientes: Lactosa, Celulosa microcristalina, Almidón glicolato de sodio, Estearato de magnesio, Eudragit S100,Talco,Dióxido de titanio y Polietilenglicol 6000 ..... c.s.

ACCIÓN TERAPÉUTICA
Laxante estimulante por contacto.

USO DEL MEDICAMENTO
LEA DETENIDAMENTE ESTA INFORMACIÓN
Está indicado para el tratamiento sintomático de corta duración, en caso de constipación, cuando las medidas higiénico-dietarias han fracasado.

CÓMO USAR ESTE MEDICAMENTO
DOSIS
Adultos y niños mayores de 12 años:
1 ó 2 comprimidos recubiertos por día, como dosis máxima.
Niños de 6 a 12 años: 1 comprimido recubierto por día.
Los comprimidos recubiertos deben ser ingeridos enteros, sin masticar y con agua. Pueden ser ingeridos al acostarse o por la mañana en ayunas.

CONTRAINDICACIONES
Hipersensibilidad a cualquier componente de la fórmula.
Niños menores de 6 años.
Cuando tenga dolores de vientre, de estómago, náuseas o vómitos, no tome laxantes o purgantes sin consultar antes a su médico.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS
Puesto que LAXAMIN tiene cobertura entérica los comprimidos no deben ser masticados o triturados. Por la misma razón, no deben administrarse antiácidos dentro de la hora siguiente de la toma de LAXAMIN.
Si Ud. está embarazada o amamantando, consulte a un médico antes de utilizar esta droga.

Los laxantes no deberían utilizarse durante más de una semana sin la prescripción de un profesional. El uso prolongado de laxantes puede producir un desequilibrio de los electrolitos, pérdida de potasio y puede precipitar la aparición de estreñimiento de rebote. Utilizar con cuidado en los casos de deshidratación severa.
La administración de laxantes en niños debe ser excepcional y debe hacerse por indicación médica. No administrar a niños menores de 6 años.

EFECTOS COLATERALES Y SECUNDARIOS
Como con todos los laxantes se han informado cólicos intestinales y flatulencia, especialmente en pacientes con constipación severa. Si se presentan estas molestias se puede disminuir la dosis.
La administración prolongada y en dosis altas puede producir diarrea e hipopotasemia.

SOBREDOSIS
En caso de toma accidental o sobredosis, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los centros toxicológicos de:
Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011)4962-6666/9247
Hospital Alejandro Posadas: (011)4654-6648/4658-7777

PRESENTACIONES:
Gotas (Picosulfato de sodio): Envases conteniendo 10 ml
Comprimidos recubiertos (Bisacodilo): Envases conteniendo 10, 20 y 40 comprimidos recubiertos

Conservar a temperatura inferior a 30°C.

MANTENER ALEJADO DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Ante cualquier duda consulte a su médico y/o a su farmacéutico.

No consumir después de la fecha de vencimiento indicada en el envase.

Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado N°19.853.
Elaborado en Laboratorios Temis Lostaló S.A.,
Zepita 3178 (C1285ABF)
C.A.B.A., República Argentina.
Director Técnico: Pablo Stahl, Farmacéutico.

Línea gratuita Temis Lostaló: 0800-321-2368
ANMAT Responde: 0800-333-1234

Fecha de la última revisión: 01/03/02

TEMIS LOSTALO

330646