



330072



330072

Laxamín

Picosulfato de Sodio

gotas

INDUSTRIA ARGENTINA

VENTA LIBRE

FÓRMULA:

Cada 100 ml contiene:

Picosulfato de sodio 750 mg
Excipientes (Ácido clorhídrico c.s.p., Agua deionizada c.s.p., Nipagin
sódico, Sorbitol 70%) c.s

ACCIÓN TERAPÉUTICA:

Laxante estimulante por contacto.

USO DEL MEDICAMENTO:

LEA DETENIDAMENTE ESTA INFORMACIÓN:

Está indicado para el tratamiento sintomático, de corta duración, en caso de constipación, cuando las medidas higiénico-dietarias han fracasado.

CÓMO USAR ESTE MEDICAMENTO:

DOSIS:

Adultos: 20 a 40 gotas, preferentemente al acostarse.

Niños de 4 a 12 años:

5 a 10 gotas, preferentemente antes de acostarse.

Niños menores de 4 años: no está indicado.

CONTRAINDICACIONES:

Cuando tenga dolores de vientre, de estómago, náuseas o vómitos no tome laxantes o purgantes sin consultar antes a su médico.

Hipersensibilidad a cualquier componente de la fórmula. Niños menores de 4 años.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:

Si se sospecha la existencia de enfermedades inflamatorias del intestino como la colitis ulcerosa, no se recomienda el uso de laxantes en la preparación de los pacientes que se someterán a un colon por enema.

Debido a que el Picosulfato se degrada por acción de las bacterias intestinales, LAXAMIN puede perder parte de su



efecto laxante en aquellos pacientes que reciben antibióticos de amplio espectro vía oral.

Si Ud. está embarazada o amamantando, consulte a un médico antes de utilizar esta droga.

No administrar a niños menores de 4 años. Los laxantes no deberían utilizarse durante más de una semana sin la prescripción de un profesional. El uso prolongado de laxantes puede producir un desequilibrio de los electrolitos, pérdida de potasio, y puede precipitar la aparición de un estreñimiento de rebote. Utilizar con cuidado en los casos de deshidratación severa. En el niño la administración de laxantes debe ser excepcional, y debe hacerse con indicación médica.

REACCIONES ADVERSAS:

Con el uso de laxantes por contacto se ha informado, ocasionalmente, leve malestar abdominal.

La administración prolongada y en dosis altas puede producir diarrea, hipopotasemia.

SOBREDOSIS:

En caso de toma accidental o sobredosis, concurrir al Hospital más cercano o comunicarse con los centros toxicológicos de: Hospital de pediatría R. Gutiérrez (011) 4962-6666/9247 Hospital Posadas: (011) 4654-6648/4658-7777

PRESENTACIONES:

Gotas (Picosulfato de sodio): Envases conteniendo 10 ml

Comprimidos recubiertos (Bisacodilo): Envases conteniendo 10, 20 y 40 comprimidos recubiertos

Ante cualquier duda consulte a su médico y/o farmacéutico.

Conservar a temperatura inferior a 30° C

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

Especialidad Medicinal Autorizada por el Ministerio de Salud.
Certificado N°19.853.

Elaborado en Laboratorios Temis Lostaló S.A.,
Zepita 3178 (C1285ABF)

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina.

Director Técnico: Pablo Stahl, Farmacéutico.

Línea gratuita Temis Lostaló: 0800-321-2368

ANMAT Responde: 0800-333-1234

Fecha de la última revisión: 21/09/2001



330072

